



teva


Guide för injektion med AJOVY[®] förfylld spruta

Till dig som ordinerats
AJOVY[®]

AJOVY[®]
(fremanezumab)
injektion 225 mg/1,5 ml

Viktig information:

- AJOVY förfylld spruta är endast avsedd för engångsbruk.
- Varje förfylld spruta innehåller 225 mg fremanezumab. Beroende på ditt doseringsalternativ behöver du använda 1 förfylld spruta eller 3 förfyllda sprutor.
- AJOVY injiceras under huden (subkutan injektion). Du ska inte injicera själv förrän du har fått utbildning av läkare eller sjuksköterska.
- Läs noggrant igenom bipacksedeln för att lära dig mer om läkemedlet.
- Dra aldrig tillbaka kolven då detta kan förstöra/skada den förfyllda sprutan.
- Skaka inte den förfyllda sprutan.
- Lagg omedelbart tillbaka kartongen i kylskåp om det finns oanvända förfyllda sprutor i kartongen.



Guidens syfte är att visa de olika stegen vid administration av den förfyllda sprutan. För mer information om AJOVY och hur du injicerar se bipacksedeln i förpackningen eller på fass.se.

Steg 1


Ta fram följande tillbehör för injektionen:

- 1 eller 3 AJOVY förfyllda sprutor, beroende på vilket doseringsalternativ du ordinerats
 - 1 sprittork per injektion
 - 1 gasväv eller bomullstuss per injektion
 - 1 behållare för stickande och skärande avfall
-

Placera de tillbehör du har tagit fram på en ren och plan yta. Vänta 30 minuter så att läkemedlet når rumstemperatur (<30 °C) för att minska obehag under injektionen. Lämna inte den förfyllda sprutan i direkt solljus. Värm inte upp den förfyllda sprutan i mikrovågsugn eller via annan värmekälla. Ta inte av nålskyddet. Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem ordentligt med en ren handduk.

Steg 2 Inspektera AJOVY förfylld spruta


- Kontrollera sprutans etikett. Kontrollera att det står AJOVY på etiketten.
- Kontrollera att läkemedlet i sprutan är klart och färglöst till lätt gulaktigt. Du kan se små luftbubblor i den förfyllda sprutan. Detta är normalt.
- Använd inte den förfyllda sprutan om du lägger märke till något av följande:
 - Sprutan verkar skadad
 - Utgångsdatum har passerat, eller om den förfyllda sprutan har varit uttagen ur kylskåp i mer än 7 dagar
 - Läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar



Steg 3

Välj ett injektionsställe från följande områden:

- **Magområdet (buken)** men undvik området cirka 5 cm runt naveln.
- **Framsidan av låren**, cirka 5 cm ovanför knät och 5 cm nedanför ljumsken.
- **Baksidan av överarmen**, området med mycket fettvävnad på den övre delen av armens baksida.




Om du ordinerats det doseringsalternativ där man ger tre injektioner vid samma tillfälle varje kvartal, kan de ges i samma område eller i ett annat område (buk, lår, överarm), men du ska undvika att injicera på exakt samma ställe.

Steg 4 Rengör injektionsstället

- Rengör det valda injektionsstället med en ny sprittork.
 - Låt huden torka 10 sekunder innan du injicerar.
 - Injicera inte AJOVY i ett område som är ömt, rött, har blåmärken, förhårdnader, tatueringar, ärr eller hudbristningar.
-



Steg 5 Så här injicerar du

- Först när du är redo att injicera, dra nålskyddet rakt ut och kasta det.
- Sätt inte tillbaka nålskyddet på den förfyllda sprutan för att förhindra skada och infektion.
- Vidrör inte nålen.




Injicera genom att följa de fyra stegen nedan:

1. Nyp försiktigt ihop 2,5 cm av huden som du har rengjort.
2. För in nålen med en vinkel på 45° till 90° i huden som du har nypt ihop.
3. Tryck långsamt in kolven.
4. Tryck ned kolven så långt det går för att injicera allt läkemedel.




- Ta bort nålen från huden.
Efter att du har injicerat allt läkemedel, dra nålen rakt upp. Sätt aldrig tillbaka skyddet på nålen, för att förhindra skada och infektion.
- Använd en ren, torr bomullstuss eller gasväv för att varsamt trycka på injektionsstället under några sekunder.
- Gnid inte på injektionsstället och återanvänd inte den förfyllda sprutan.



Om ditt doseringsalternativ är 675 mg, administrerat vid ett tillfälle per kvartal, upprepa stegen ovan med den andra och tredje förfyllda sprutan för att injicera hela den ordinerade dosen.

Steg 6 **Kassera den förfyllda sprutan omedelbart**

- Lägg alltid de använda förfyllda sprutorna (med nålen fortfarande fastsatt) i en behållare för stickande och skärande restavfall omedelbart efter användning.
- Kasta inte lösa nålar, sprutor eller förfyllda sprutor med hushållsavfallet.
- Återvinn inte behållaren för stickande och skärande avfall.
- Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska hur du kasserar behållaren.



Behöver du hjälp med att ta din AJOVY® (fremanezumab) injektion?

Titta på en instruktionsfilm på www.fass.se
eller logga in på www.ajovypatient.se

AJO-SE-00067 augusti 2021



Teva Sweden AB Box 1070 25110 Helsingborg info@teva.se